เฉลยติว Fit For Final
ฟิสิกส์ ม.ปลาย
เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่

หน้า 12 ข้อ 6 ตอบ 2

6. จากการทดลองกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันข้อที่ 2 ได้กราฟระหว่าง a และ $\frac{1}{m}$ ดังรูป ถ้าเขียนกราฟระหว่าง a และ m จะได้ดังกราฟดังรูปใด



1.

2.

3.


4.


5.


เรียนฟรี เห็นผลลัพธ์ที่ we

หน้า 14 ข้อ 8 ตอบ 2

8. ใบไม้ที่ตกลงสู่พื้นมีความเร่งน้อยกว่า g ในบริเวณนั้น เราสามารถใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันข้อใดมาอธิบายได้
   1. กฎข้อที่ 1
   2. กฎข้อที่ 2
   3. กฎข้อที่ 1 และ 2
   4. กฎข้อที่ 3
   5. กฎข้อที่ 1 และ 3



$\Sigma F = ma$

$mg = ma$

$a = g$ "ตกอิสระ"



$\Sigma F = ma$

$mg - f = ma$

$g - \frac{f}{m} = a$

$a = g - \frac{f}{m}$ "น้อยกว่า g"

เรียนพี่ก เห็นผลลัพธ์ที่จริง

หน้า 16 ข้อ 11 ตอบ $3\ m/s^2$

จากรูปที่กำหนดให้ จงตอบคำถามข้อ 11 - 12



11. เมื่อพื้นลื่น วัตถุ W เท่ากับ 10 กิโลกรัม และ F เท่ากับ $20\sqrt{3}$ นิวตัน ขนาดของความเร่งจะมีค่ากี่เมตรต่อวินาที^{2}

$$\Sigma F_x = ma$$
$$F\cos 30 = ma$$
$$20\sqrt{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 10a$$
$$a = 3\ m/s^2 \quad \text{—} *$$

หน้า 16 ข้อ 12 ตอบ 0 N

12. ถ้าวัตถุ W เท่ากับ 2 กิโลกรัม และ F เท่ากับ 40 นิวตัน แรงปฏิกิริยาจากพื้นที่กระทำต่อวัตถุมีค่ากี่นิวตัน

$$\Sigma F_y = 0$$
$$\uparrow = \downarrow$$
$$N + F\sin 30 = mg$$
$$N = mg - F\sin 30$$
$$N = 20 - 20\left(\frac{1}{2}\right)$$
$$N = 0\ N \quad \text{—} *$$

"พอดีลอยจากพื้น"

เรียนสนุก เห็นผลลัพธ์ได้จริง

หน้า 18 ข้อ 14 ตอบ 1

14. ชายคนหนึ่ง มีมวล 75 กิโลกรัม ยืนบนชั่งในลิฟต์ โดยมวลรวมของลิฟต์ ตาชั่ง และคน เท่ากับ 750 กิโลกรัม เดิมลิฟต์หยุดนิ่ง ($u=0$) และเร่งขึ้นไปเป็นเวลา 3 วินาที (t) ปรากฏว่า สายเคเบิลดึงลิฟต์มีแรงตึง (T) 8,400 นิวตัน จงหาความเร่งของลิฟต์เมื่อปลายวินาทีที่ 3 ในหน่วยเมตร/วินาที^{2}

1. 1.2 2. −1.2 3. 2.2 4. −2.2

$a = ?$



$\Sigma F_y = ma$

$T - Mg = Ma$

$8400 - 7500 = 750a$

$900 = 750a$

$a = 1.2 \ m/s^2$ — *

หน้า 19 ข้อ 16 ตอบ 160 N, 100 N

16. เมื่อใช้แรงฉุด 200 นิวตัน ดึงวัตถุ 3 ก้อน ซึ่งมีมวล 2, 3 และ 5 กิโลกรัม ขึ้นดังรูป จงหาแรงตึงในเส้นเชือกแต่ละเส้นและความเร่งของระบบมวลนี้



$\frac{\Sigma F}{m} = a$; $\frac{200 - 100}{10} = a = 10 \ m/s^2$ — *

$a = mg$; $\frac{\Sigma F}{m}$ = ศักดา

$\frac{T_2}{5} = \frac{T_1}{8} = \frac{200}{10}$

$T_1 = 8(20) = 160 \ N$

$T_2 = 5(20) = 100 \ N$ } — *

เรียนลุก เห็นผลลัพธ์ได้จริง

หน้า 19 ข้อ 17 ตอบ 12 m/s^2

ไม่มี f, m = 10 kg

17. จากรูป พื้นเอียงลื่น A = 2 kg, B = 8 kg, F = 225 N จงหาความเร่งของวัตถุ A มีค่าเท่ากับกี่เมตร/วินาที^{2}



a: mg ใช้แม้อน แนวราบ!

แต่ข้อนี้ให้หา a ∴ $\frac{\Sigma F}{m} = a$

$$a = \frac{F\cos 37 - mg\sin 37}{m}$$

$$= \frac{225\left(\frac{4}{5}\right) - 10(10)\left(\frac{3}{5}\right)}{10}$$

$$= \frac{180 - 60}{10}$$

$$a = 12 \ m/s^2 \quad \text{—} *$$

เรียนฟรี เห็นผลจริง

หน้า 20 ข้อ 18 ตอบ 2

18. มวล m_1 = 2.0 กิโลกรัม วางอยู่บนโต๊ะแนวระดับที่ไม่มีความฝืด ห่างจากขอบโต๊ะ 1.00 เมตร ผูกมวล m_1 ด้วยเชือก คล้องผ่านลูกรอกและถ่วงปลายเชือกด้วยมวล m_2 = 0.5 กิโลกรัม ถ้าเดิมเชือกตึง m_2 อยู่สูงจากพื้น 0.50 เมตร แล้วปล่อยให้มวลทั้งสองเคลื่อนที่ จงหาแรงตึงในเส้นเชือก



1. 1.0 นิวตัน
2. 4.0 นิวตัน
3. 5.0 นิวตัน
4. 15.0 นิวตัน

$\frac{\Sigma F}{m}$; m_1 & m_2 : $\frac{m_2 g}{m_1 + m_2} = \frac{T}{m_1}$

$\frac{0.5(10)}{2+0.5} = \frac{T}{2}$

$\frac{5}{2.5} = \frac{T}{2}$

$T = 4$ N

หน้า 21 ข้อ 20 ตอบ 2

20. มวล A และ B วางห่างกัน 6 เมตร ทำให้เกิดแรงดึงดูดระหว่างกันเท่ากับ F ถ้าต้องการให้เกิดแรงกระทำต่อกันเป็น $\frac{4}{9}$ เท่าของแรงเดิม จะต้องวางมวลทั้งสองห่างกันกี่เมตร

R_1 F_1 $R_2 = ?$ $F_2 = \frac{4}{9}F$

1. 4 เมตร
2. 9 เมตร
3. 16 เมตร
4. 36 เมตร

$F = \frac{GMm}{R^2}$ --> $F \propto \frac{1}{R^2}$

เรียนสนุก เห็นผลลัพธ์ได้จริง